

# Ferro Fort® Duodenal

Ferrous Glycine Sulphate

## فروفورت® دئودنال

فروس گلایسین سولفات

فروفورت® دئودنال به صورت کپسولهای انتریک کوتد خوراکی و به رنگ‌های قهوه‌ای مایل به قرمز (سر) و گل بهی (بدن) حاوی پلت انتریک کوتد فروس گلایسین سولفات (معادل با ۸۰ میکرگرم آهن دو طرفی) است و در جعبه‌های ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.  
"این فرآورده یک مکمل تغذیه‌ای است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد."

### مورد مصرف:

کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن

### راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این فرآورده موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر

### موارد منع مصرف:

- ۱- حساسیت به هر یک از مواد متشکله این فرآورده
- ۲- مقادیر زیاد آهن خون (هموکروماتوز، همولیز مژمن)
- ۳- در اختلالات مصرف آهن (مانند کم خونی سیدروپلاستیک، کم خونی ناشی از سمومیت با سرب، تالاسی)
- ۴- مصرف در کودکان کمتر از ۶ سال

### مصرف در بارداری و شیردهی:

با توجه به افزایش نیازمندی به آهن طی دوران بارداری و شیردهی، مصرف این فرآورده طی این دوران باید به طور منظم و در مقادیر تجویز شده توسط پزشک انجام گیرد.

### هشدارها:

حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این فرآورده تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

- بیماران مبتلا به رژم‌های روده‌ای
- افراد سالخوردۀ با علایم کمبود آهن، کم خونی یا منشأ نامشخص که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و عامل هموراژی (خونریزی)
- در بیماران با کم خونی ناشی از بیماری‌های شدید کلیوی، این دارو باید همراه با اریتروبووتین مصرف گردد.

### موارد احتیاط:

- ۱- این فرآورده با دوز بالا می‌باشد و با توجه به اینکه ۷۷٪ بالاتر از حداکثر مقدار مصرف مجاز روزانه است، باید حتماً با مشورت پزشک یا داروساز مصرف شود.
- ۲- در هنگام رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، مراقبت خاصی مورد نیاز نمی‌باشد.
- ۳- آزمایش تشخیصی بنزیدین در هنگام مصرف آهن می‌تواند مثبت گردد.
- ۴- به دلیل امکان تغییر تیره رنگ مدفعه، آزمایش وجود خون مخفی در مدفعه ممکن است مثبت شود.

### تداخل‌های داروبی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:  
داروهای ضد درد یا ضد روماتیسم (مانند سالیسیلات‌ها و فنتیل بوتاژون) - مصرف نوام این داروها با این فرآورده می‌تواند باعث وحامت تحریکات مخاط گوارشی گردد.

تراسیکلین‌ها، داروهای بیس‌فسفونات - جذب آهن، تراسیکلین‌ها و داروهای بیس‌فسفونات مهار می‌گردد.

کلسستیرامین، داروهای حاوی کلسیم، منیزیم و الومینیم (مانند آنتی اسیدها، نمک‌های جانشین کلسیم و منیزیم) - جذب آهن مهار می‌گردد.

پنی‌سیلامین، ترکیبات خوارکی طلا Al - متبل دوپا، لوودوبا، Al - تیروکسین - جذب این داروها اگر همزنان با آهن مصرف شوند، مختلف می‌گردد.

آناتی‌بیوتیک‌های فلورو کینولونی مانند سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین، لوفلوكساسین، آفلوکساسین - جذب این داروها در مصرف همزنان با آهن به طور قابل توجهی کاهش می‌باید.

به طور کلی فاصله زمانی مصرف این فرآورده با داروهای فوق باید حداقل ۲ ساعت باشد.

### مقدار و نحوه صحیح مصرف:

مقدار مصرف را پزشک تعیین می کند.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این فرآورده به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این فرآورده را با مشورت پزشک یا داروساز مصرف نمایید.
- ۲- مواد موجود در غذاهای گیاهی که با آهن تشکیل کمپلکس می دهند (مانند فیتات ها، آگزالات ها و فسفات ها) و همچنین مواد موجود در قهوه، چای، شیر و نوشیدنی های کولا از جذب آهن به درون خون جلوگیری می نمایند.
- ۳- این فرآورده باید بدون جویدن و همراه با مقادیر کافی آب مصرف شود.
- ۴- این فرآورده باید به صورت ناشتا و با معدده خانی در هنگام صحیح (حدود یک ساعت قبل از صبحانه) و یا در فاصله زمانی مناسب، حدود ۲ ساعت قبل و یا بعد از غذا مصرف شود.
- ۵- در صورت اشکال در بلع کپسول، محتویات درون آن را به طور کامل تخلیه و به درون یک قاشق سوپخوری منتقل نمایید. سپس آن را با مقادیر کافی آب میل کنید.
- ۶- دوره مصرف توسط پزشک تعیین می گردد.
- ۷- مصرف خوارکی آهن باید حتی پس از نرمال شدن نتایج هموگلوبین، همراه با پایش میزان فریتین سرم ادامه باید.
- ۸- دوره مصرف بر اساس شدت کم خونی و نیاز فرد معمولاً ۳ تا ۶ ماه است که ممکن است در برخی موارد طولانی تر نیز گردد.
- ۹- در مواردی که بنظر می آید اثر فرآورده به شدت قوی و یا سیلار ضعیف است، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۱۰- در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت از فرآورده، آن نوبت را مصرف ننموده و برname عادی خود را ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار فرآورده خودداری کنید.

### عارض جانبی:

این فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

- ۱- مشکلات گوارشی مانند اسهال، بیوست، سوزش سردهل یا استفراغ ممکن است حادث شود. کثرت وقوع با مقدار مصرف افزایش می باید.
  - ۲- واکنش های حساسیتی (مانند حساسیت پوستی) در موارد نادر ممکن است ظاهر شود.
  - ۳- تغییر تیره زنگ مدفوع ممکن است در طی مصرف ایجاد شود که ناشی از مصرف آهن بوده و بی خطر است.
  - ۴- تغییر رنگ برگشت پذیر دندان ها بندرت مشاهده شده است.
- توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی مشابه با عوارض جانبی ولی باشد بیشتر، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

### ترکیبات:

فروں گلایسین سولفات، این بی سیدز، پلی وینیل پیرولیدون، متاکریلیک اسید کوپلیمر، رنگ پونسو ۴ آر، تالک خالص، تیتانیوم دی اکساید و دی بوتیل فتالات

### شرایط نگهداری:

- فرآورده را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف فرآورده های تاریخ گذشته خودداری کنید.

- فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

### ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عیدی

۱۳۹۵

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۷، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو:

۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

www.abidipharma.com

VOC@abidipharma.com

سایت اینترنتی:

ایمیل جهت ارتباط مشتری:

تاریخ ویرایش: ۹۸/۱۱/۰۷



210mm×150mm